

安贝生坦说明、价格、副作用、注意事项

安贝生坦说明

安贝生坦 (Ambrisentan) 是用于治疗肺动脉高压，可以使肺部的血管松弛，进而降低血压。内皮素存在于所有人的血液中，而特发性肺动脉高压、家族性肺动脉高压患者和其他继发性肺动脉高压患者的内皮素水平都高于正常。内皮素由血管内皮细胞分泌，它结合并激活平滑肌细胞表面的二类受体：内皮素 A 和内皮素 B (ETA 和 ETB) 受体。一经结合，它会引起血管收缩和平滑肌细胞生长、增殖，也可能增加纤维组织形成。在实验室中被设计和制造的分子可阻止内皮素与受体的结合，这种药物即被称为内皮素受体拮抗剂。这类药物的一个很大优势是口服制剂。

内皮素受体拮抗剂的作用恰恰与内皮素相反：扩张血管，并阻止细胞不必要的生长和增殖。患者使用它们可能不会有立竿见影的改善，而要在一个月或两个月后表现出疗效。最终，大多数的病人进入稳定疗效的平台区，其他病人则会在很长的一段时间内持续改善。

ETA 受体被认为是负责血管收缩，促进细胞生长；ETB 受体则被认为主要参与肺动脉高压血管内的瘢痕形成。与 ETB 受体结合并不是一件坏事，因为它可以引起一氧化氮的产生。如此，目前不能确定的是选择性受体拮抗剂或双受体拮抗剂哪个更好，只能继续关注最新的研究结果。

安贝生坦价格：印度安贝生坦约 2400 人民币

安贝生坦副作用：

随着其所需的影响，安比生坦可能会导致一些不良影响。虽然并非所有这些副作用都可能发生，但如果发生这些副作用，则可能需要医疗护理。

如果在服用安立生坦时出现以下任何副作用，请立即与您的医生联系：

比较普遍：手臂，手，小腿或脚部肿胀或肿胀、体重快速增长、手或脚刺痛、不寻常的体重增加或减少。

不常见：咳嗽、快速，不规则，冲击或竞速心跳或脉搏、发热、头痛、肌肉疼痛、眼睛和颧骨周围疼痛或压痛、喉咙痛、鼻塞或流鼻涕、胸部紧实、呼吸困难、不寻常的疲倦或无力。

发病率未知：腹部或胃部疼痛或压痛、胸痛、粘土色的凳子、黑尿、尿量减少、食欲下降、扩张的颈静脉

极度疲劳、呼吸不规则、脸上，眼皮，嘴唇，舌头，喉咙，手，腿，脚或性器官上的大的蜂巢状肿胀、食欲不振、恶心和呕吐嘈杂，响亮的呼吸、皮肤苍白、皮疹，瘙痒、休息时呼吸困难、用劳累呼吸困难、黄色的皮肤或眼睛。

如果在服用安贝生坦时发生以下任何过量症状，请立即获得紧急救助！

过量的症状：模糊的视野、混乱、突然从躺卧或坐姿起床时头晕，晕眩或头晕、出汗。

安贝生坦可能会出现一些副作用，通常不需要医疗照顾。随着身体对药物的调整，这些副作用可能在治疗过程中消失。此外，您的医疗保健专业人员可能会告诉您有关预防或减少这些副作用的方法。

安贝生坦注意事项：

怀孕女性不服用，因为它可能会导致胎儿的危害。

药物很可能会产生严重的出生缺陷，因为这一效应在动物研究中一直出现。

建议：

在治疗开始前排除妊娠。

在治疗期间和停药后 1 个月内应使用可接受的避孕方法。

在每次处方之前和停药后 1 个月内必须进行阴性妊娠检测。

如果大家还有什么疑问或者不了解的地方，欢迎咨询！进入印度抗癌药品网上药店官网：
www.apolopharmacy.com 了解更多药品详情！