

服用药品艾曲波帕注意事项和剂量

艾曲波帕（Eltrombopag）是一种蛋白质的人造形式，能够增加人体血小板（血液凝固细胞）的生成。艾曲波帕可以通过增加血液中的血小板来降低出血风险。

艾曲波帕用于预防慢性免疫性血小板减少性紫癜（ITP）患者的出血事件，ITP 是血液中缺乏血小板引起的出血状况。该药用于 1 岁以上的成人和儿童，其他药物未经成功试用。

艾曲波帕还用于预防用干扰素（如 Intron A, Infergen, Pegasys, PegIntron, Rebetron, Redipen 或 Sylatron）治疗的慢性丙型肝炎成人的出血。

艾曲波帕应该如何服用？

按照您的处方标签上的所有方向。医生会根据你的身体状况调整剂量。如果您有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。

至少在餐前 1 小时或餐后 2 小时，空腹服用艾曲波帕。不要把这种药用牛奶或钙强化的果汁。

按照所有说明混合艾曲波帕口服混悬液。仅将口服悬浮液粉末与水混合。使用计量注射器来测量水分并给出正确的剂量。

不要压碎艾曲波帕片剂。用整杯水吞下整个药片。

你将需要频繁的血液检查来检查你的肝功能。你的眼睛也可能需要检查白内障形成的迹象。

如果你服用其他药物治疗慢性丙型肝炎，请告诉你的医生，如果你停止使用任何其他肝炎药物。

长期服用艾曲波帕会对您的骨髓造成有害影响，导致严重的血细胞疾病。

在完全有效地预防出血事件之前，服用该药物可能需要长达 4 周的时间。继续服药，并告诉你的医生，如果你有任何瘀伤或出血事件 4 周后的治疗。

在室温下存放，远离潮湿和热源。将药片放在原来的容器中，连同吸湿防腐剂的小包或罐子。混合艾曲波帕口服悬浮液后，室温下储存，30 分钟内使用。

停止服用艾曲波帕后，出血的风险可能比开始治疗之前还要高。在停止服用艾曲波帕后，要特别小心，以避免伤口至少 4 周。这段时间你的血液需要每周检测一次。

服用艾曲波帕时应该避免什么？

避免在服用艾曲波帕之前或之后 4 小时内服用其他药物。这包括抗酸剂，维生素，矿物质补充剂或含有铝，钙，铁，镁，硒或锌的任何其他产品。

在服用艾曲波帕之前或之后至少 4 小时，避免所有含有钙的乳制品或产品（包括强化果汁）。

避免可能增加出血或受伤风险的活动。剃须或刷牙时要特别小心，以防止出血。

印度抗癌药品更多详情咨询

电话：0091-9205113743

电子邮箱：lifesmarthealthcare@gmail.com

官网：www.apolopharmacy.com