

肾癌治疗的方法和类型

肾癌的治疗取决于疾病的类型和阶段。

手术

手术是最常见的治疗方法，因为肾癌并不经常对化疗和放疗作出反应。手术复杂性可以通过 **RENAL Nephrometry** 评分系统来估计。如果癌症没有传播，通常会通过手术去除。在某些情况下，这涉及去除整个肾脏，但是大多数肿瘤可以部分去除以消除肿瘤并保留肾脏的剩余正常部分。手术并不总是可能的 - 例如患者可能有其他妨碍它的医疗条件，或者癌症可能在身体周围传播，医生可能无法将其移除。目前还没有证据表明，手术后没有已知的残留疾病即辅助治疗的全身医疗治疗有助于提高肾癌的生存率。如果不能用手术治疗癌症，则可以使用其他技术，例如冷冻肿瘤或用高温处理。然而，这些尚未被用作肾癌的标准治疗方法。

药物等生物疗法

其他治疗方案包括生物疗法，如依维莫司，托丝壳，**nexavar**，索坦 **sutent** 和 **axitinib**，使用免疫治疗，包括干扰素和白细胞介素-2。免疫治疗在 10% 至 15% 的人中成功。舒尼替尼是当前辅助治疗标准，与吡罗他尼一起使用；这些治疗常常是依维莫司，阿替克替尼和索拉非尼。

在第二线设置中，奈韦布班在 2015 年显示了依维莫司治疗晚期清除肾细胞癌的总生存优势，并获得 FDA 批准，**Cabozantinib** 也显示了依维莫司的总体生存益处，并于 2016 年被 FDA 批准为二线治疗。与依维莫司联合使用的列伐他汀于 2016 年获得批准，该患者只有一条先前的血管生成治疗方案。

在 **Wilms** 肿瘤中，化疗，放疗和手术是接受治疗，取决于疾病诊断阶段。

儿童肾癌

儿童报告的大多数肾癌是 **Wilms** 肿瘤。当胎儿仍然在子宫中发育时，这些肿瘤可以开始生长，直到孩子几岁才可能不会出现问题。在 5 岁以下的儿童中，**Wilms** 肿瘤最常见，但在大龄儿童或成年人中很少被诊断出。仍然不清楚是什么导致大多数威尔姆斯的肿瘤。最常见的症状是尿液中的腹部和血液肿胀。

印度抗癌药品更多详情咨询

电话：0091-9205113743

电子邮箱：lifesmarthealthcare@gmail.com

官网：www.apolopharmacy.com